

1) Работу выполняем письменно

2) Обязательно ОТМЕЧАЕМСЯ О ПРИСУТСТВИИ в комментариях на сайте

3) МОЖНО РАБОТЫ ОТПРАВЛЯТЬ В ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

<https://vk.com/id17458892>

### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20

**Тема:** Правила оформления рецепта.

**Наименование работы:** Оформление латинской части рецепта.

**Цель:** Научиться правильно оформлять латинскую часть рецепта.

**Норма времени** 2 часа.

**Материально – техническое оснащение рабочего места:** инструкционные карты, рабочие тетради.

**Литература:** Куликова, Ю. В. Латинский язык : учебник и практикум для академического бакалавриата.

#### Вступительный инструктаж

1. Работать в спецодежде (халат, перчатки)
2. Запрещается находиться в кабинете в верхней одежде, а также вешать ее на лабораторное оборудование.
3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов портфели и сумки.
4. Запрещается передвижение без необходимости.
5. Соблюдать дисциплину при выполнении практической работы.
6. По окончании работы привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование преподавателю.

#### СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

##### Задание 1. Выписать рецепты:

1. 50 таблеток, содержащих по 0,25 мг резерпина (Reserpinum). Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.
2. 28 таблеток, содержащих по 5 мг небиволола (Nebivolola). Назначить по 1 таблетке 1 раз в день.
3. 6 таблеток, содержащих по 300 мг барбитала-натрия (Barbitalum- natrium). Назначить по 1 таблетке на ночь.
4. 20 таблеток, содержащих по 250 000 ЕД нистатина (Nystatinum). Назначить по 1 таблетке 4 раза в день.
5. 20 капсул, содержащих по 10 000 ЕД панкреатина (Pancreatin). Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.
6. 20 таблеток, содержащих по 15 мг кодеина (Codeinum) и по 300 мг терпингидрата (Terpinhydratum). Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.
7. 20 таблеток, содержащих по 30 мг кофеина (Coffeinum) и по 20 мг фенобарбитала (Phenobarbitalum). Назначить по 1 таблетке 2 раза в день.
8. 20 таблеток, содержащих по 100 мг окситетрациклина гидрохлорида (Oxytetracyclini hydrochloridum) и дифосфата кальция (Calcii diphosphoricum). Назначить по 2 таблетки 4 раза в день.
9. 20 таблеток «Теофедрин» («Theophedrium»). Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.
10. 10 таблеток «Кофальгин» («Cofalgium»). Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.
11. 20 таблеток «Бисептол-480» («Biseptolum-480»). Назначить по 2 таблетки 2 раза в день.
12. 50 драже, содержащих по 8 мг бромгексина (Bromhexinum). Назначить по 2 драже 3 раза в день.

13. 20 драже, содержащих по 100 мг диазолина (Diazolinum). Назначить по 1 драже 1 раз в день после еды.
14. 3 капсулы «Азитрал» («Azitral»). Назначить за 1 час до еды 1 раз в день на 3 дня.
15. 60 драже «Фестал» («Festalum»). Назначить по 2 драже 3 раза в день во время еды.
16. 20 драже «Панзинорм-форте» («Panzinorm-forte»). Назначить по 1 драже 3 раза в день во время еды.
17. 20,0 порошка анестезина (Anaesthesinum). Назначить для нанесения на рану.
18. 25,0 порошка стрептоцида (Streptocidum). Назначить для нанесения на пораженные участки.
19. Порошок, содержащий 20,0 цинка окиси (Zincioxydum) и 30,0 талька (Talcum). Для присыпки.
20. Порошок, содержащий по 20,0 оксида магния (Magnesii oxydum) и натрия гидрокарбоната (Natrii hydrocarbonas). Назначить по 1/2 чайной ложки 3 раза в день после еды.
21. Порошок, содержащий 1,0 борной кислоты (Acidumboricum) и 50,0 белой глины (Bolusalba). Для присыпки.
22. Порошок, содержащий 0,5 кислоты салициловой (Acidumsalicylicum) и 50,0 крахмала пшеничного (Amylum Triticici). Для присыпки.
23. 6 порошков панкреатина (Pancreatinum) по 600 мг. Назначить по 1 порошку 3 раза в день после еды.
24. 12 порошков бромкамфоры (Bromcamphora) по 250 мг. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
25. 30 порошков, содержащих по 0,2 кислоты аскорбиновой (Acidum ascorbinicum) и 0,01 тиамин бромид (Thiamini bromidum). Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
26. 12 порошков, содержащих по 20 мг этилморфина гидрохлорида (Aethylmorphini hydrochloridum) и 40 мг натрия гидрокарбоната (Natrii hydrocarbonas). Назначить по 1 порошку 2 раза в день.
27. 14 порошков, содержащих по 0,015 кодеина фосфата (Codeini phosphas) и 0,25 терпингидрата (Terpinhydratum). Назначить по 1 порошку 2 раза в день.
28. 6 порошков хинина гидрохлорида (Chinini hydrochloridum) по 30 мг. Назначить по 1 порошку 2 раза в день.
29. 30 порошков, содержащих по 0,01 рибофлавина (Riboflavinum). Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
30. 20 порошков, содержащих по 30 мг рутина (Rutinum) и 50 мг кислоты аскорбиновой (Acidum ascorbinicum). Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
31. 10 порошков, содержащих по 20 мг папаверина гидрохлорида (Papaverini hydrochloridum) и 3 мг платифиллина гидротартрата (Platyphyllini hydrotartras). Назначить по 1 порошку 2 раза в день.
32. 15 порошков, содержащих по 5 мг димедрола (Dimedrolum). Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
33. 10 порошков из порошка листьев наперстянки (pulvisfolia Digitalis) по 40 мг. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.
34. 20 порошков из травы термопсиса (herba Thermopsisidis) по 100 мг. Назначить по 1 порошку 5 раз в день.
35. 60,0 гранул амидопирин (Amidopyrinum). Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день, предварительно растворив в 200 мл кипяченой воды.
36. 50,0 гранул ламинарида (Laminaridum). Принимать по 2 чайные ложки 3 раза в

день после еды.

37. 20 пакетиков, содержащих по 200 мг гранул ацетилцистеина (Acetylcysteinum). Принимать внутрь по 1 пакетик 2 раза в день, предварительно растворив содержимое пакетика в 1/2 стакана воды.

38. 60,0 гранул прозерина (Proserinum). Растворить в кипяченой воде – до 100 мл. Принимать по 1 десертной ложке.

39. 30 пакетиков с гранулами «Фаспик» («Faspic»). Принимать по 1 пакетик 3 раза в день, предварительно растворив пакетик в теплой воде.

40. 30 капсул ифирала (Ifiral) по 20 мг. Назначить по 1 капсуле 4 раза в день для ингаляций.

41. 20 капсул ампициллина (Ampicillin) по 0,5. Назначить по 1 капсуле 3 раза в день.

42. 20 капсул ретард кардикета (Kardiket) по 120 мг. Назначить по 1 капсуле 2 раза в день.

43. 25 капсул, содержащих по 5000 МЕ ретинола ацетата (Retinoli acetat). Назначить по 1 капсуле в сутки.

44. 30 капсул, содержащих по 0,2 мл 50 % раствора токоферола ацетата (Tocopheroli acetat) в масле. Назначить по 1 капсуле в день.

45. 100 капсул «Клонаком-П» («Klonacom-P»), Назначить по 2 капсулы 3 раза в день.

**должен знать:** структуру рецепта; латинскую часть рецепта; основные лекарственные формы; наиболее употребляемые выражения с предлогами; основные рецептурные сокращения.

**должен уметь:** оформлять латинскую часть рецепта, расшифровывать сокращения в рецептах.

**Заключительный инструктаж:** после завершения работы убрать рабочее место, собрать инструкционные карты.

**Контрольные вопросы:**

1. Дать определение рецепту как документу.
2. Правила оформления «латинской» части рецепта.
3. Классификация лекарственных форм.
4. Правила выписывания в рецепте твердых, жидких, мягких и инъекционных лекарственных форм.